

Parisien Libéré 26 septembre 1979

Soucoupes volantes : des disques de poussière?

MOSCOU.— Les « OVNI » (Objets volants non identifiés) ne seraient, selon l'Agence Tass, que des « accumulations de particules de poussière ou d'eau » qui prendraient la forme de « disques » en pénétrant dans l'atmosphère.

« Ces formations visibles dans l'atmosphère » seraient provoquées, selon les spécialistes de l'Institut océanographique de l'Académie des sciences d'U.R.S.S., par des « tourbillons de masses aériennes, lors de la pénétration de particules de poussière ou d'eau. Ces mouvements seraient dus à l'hétérogénéité des couches de l'atmosphère et à leur différence de densité ».

Ces spécialistes sont parvenus à reconstituer en laboratoire les conditions permettant l'apparition d'un tel phénomène. Ils ont vu se former sous leurs yeux des « soucoupes volantes », ajoute l'agence soviétique.

Selon ces mêmes spécialistes, « l'apparition sous forme de disques de formations naturelles peut se produire aussi bien dans les basses couches de l'atmosphère que plus haut, à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres de la surface terrestre ».

La fréquence de ces apparitions serait liée, selon les géophysiciens soviétiques, à l'accroissement de la pollution atmosphérique.

26/09/79 - P.L.

Parisien Libéré ?? ?? 1979

OVNI ou nuages d'insectes ?

WASHINGTON.— Les soucoupes volantes pourraient bien n'être que des essaims d'insectes, produisant une décharge électrique en traversant un champ électrique atmosphérique, selon un article publié par deux chercheurs américains, MM. Philip-S. Callahan et R.W. Mankin, du laboratoire de recherche biologique de Gainesville (Floride), du secrétariat américain à l'Agriculture, dans le numéro de novembre d'« Optique appliquée », une revue de la Société américaine d'optique.

Les deux chercheurs affirment qu'il existe une relation entre de nombreux cas d'apparition d'objets volants non identifiés, entre 1965 et 1968, dans l'Utah, et la présence, au même moment, dans le ciel de cet Etat américain, d'énormes essaims de papillons du ver de l'épicéa. Ils ont, en effet, réalisé plusieurs séries d'expériences, au cours desquelles des insectes de cette espèce ont été placés dans un champ électrique.

Immédiatement, leur présence déclencha une décharge, à leur voisinage immédiat, laquelle produit une émission visible de lumière.

MM. Callahan et Mankin estiment donc qu'un grand nombre des quelque 30.000 apparitions d'O.V.N.I. signalées à l'armée de l'air américaine, pourraient n'être que des vols de nuages d'insectes.

P.L. du ? 7